



## **DERMATAR 15mg/g + 15mg/g + 0,5mg/g**

**Acido salicilico/Solfoititolato di ammonio/Betametasone 17-valerato 21-acetato**

**Legga attentamente questo foglio prima di usare questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.**

**Usi questo medicinale sempre come esattamente descritto in questo foglio o come il medico o il farmacista le ha detto di fare.**

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se desidera maggiori informazioni o consigli, si rivolga al farmacista.
- Se si manifesta uno qualsiasi degli effetti indesiderati, tra cui effetti non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

### **Contenuto di questo foglio:**

1. Cos'è DERMATAR e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di usare DERMATAR
3. Come usare DERMATAR
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare DERMATAR
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### **1. Cos'è DERMATAR e a cosa serve**

DERMATAR contiene i principi attivi Acido salicilico, Solfoititolato di ammonio e Betametasone 17-

valerato 21-acetato ed appartiene alla categoria dei medicinali corticosteroidi con antisettici per uso cutaneo.

DERMATAR è indicato per il trattamento di eczemi subacuti, cronici, lichenificati, lichen verrucosi, psoriasi in fase di riacutizzazione e in tutte le dermatopatie a componente infiltrativa e cronica.

Si rivolga al medico se non si sente meglio o se si sente peggio.

### **2. Cosa deve sapere prima di usare DERMATAR**

#### **Non usi DERMATAR**

- se è allergico all'Acido salicilico, al Solfoititolato di ammonio, al Betametasone 17-valerato 21-acetato o ad uno qualsiasi degli altri componenti di questo medicinale (elencati al paragrafo 6).
- Se soffre di tubercolosi della pelle (TBC cutanea)
- Se soffre di herpes simplex
- Se ha malattie virali con localizzazione cutanea.

### **Avvertenze e precauzioni**

Si rivolga al medico o al farmacista prima di usare DERMATAR.

L'applicazione cutanea dei cortisonici nel trattamento di dermatosi estese e per periodi prolungati, può determinare un assorbimento attraverso la pelle nel sangue (assorbimento sistemico); tale evenienza si verifica più facilmente nel trattamento delle pieghe cutanee e quando si ricorre al bendaggio occlusivo.

Nei neonati il pannolino può fungere da bendaggio occlusivo (non traspirante).

DERMATAR non deve essere applicato alle mucose, agli occhi, alle labbra e alle narici.

L'uso di DERMATAR, specie se prolungato, può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione. In tal caso interrompa il trattamento e consulti il medico per adottare idonea terapia.

L'uso di DERMATAR può dare fenomeni di fotosensibilizzazione. Prima di esporre la lesione trattata alla luce, consulti il medico.

Contatti il medico se si presentano visione offuscata o altri disturbi visivi.

### **Bambini**

Nei neonati il pannolino può fungere da bendaggio occlusivo.

Utilizzi DERMATAR nella primissima infanzia solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.

### **Altri medicinali e DERMATAR**

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

Non è nota alcuna interazione con altri medicinali.

### **Gravidanza e allattamento**

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di usare questo medicinale.

Utilizzi DERMATAR durante la gravidanza e l'allattamento solo in caso di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico.



## Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Nessun effetto sulla capacità di guidare veicoli e di utilizzare macchinari.

## DERMATAR contiene:

- Alcoli di lanolina che possono causare reazioni cutanee locali (ad es. dermatiti da contatto).
- Butilidrossianisolo che può causare reazioni sulla pelle localizzate (ad es. dermatiti da contatto) o irritazione agli occhi e alle mucose.

## 3. Come usare DERMATAR

Usi questo medicinale seguendo sempre esattamente quanto riportato in questo foglio o le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

DERMATAR è solo per uso cutaneo.

DERMATAR va applicato sulla zona lesa con massaggio lieve e penetrante, in quantità non eccessiva una o due volte al giorno.

Prima di una seconda applicazione, eliminare eventuali residui con un tampone imbevuto di olio di oliva.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

## 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Trattamenti prolungati con corticosteroidi possono provocare i seguenti effetti:

- Ippigmentazione (diminuzione del normale colore della pelle);
- Ipertricosi (aumento dei peli);
- Eruzioni acneiformi; (comparsa di bolle con pus)
- Follicoliti (infiammazione del follicolo pilifero).

Col bendaggio occlusivo applicato per lungo tempo si possono manifestare:

- Atrofia cutanea (perdita di consistenza e di elasticità della pelle);
- Macerazione;
- Strie (smagliature della pelle);
- Infezioni secondarie.

Il solfoititolato di ammonio può dare fenomeni di fotosensibilizzazione.

Qualora si manifestino tali effetti, sospendere il trattamento ed istituire appropriate terapie.

Si può verificare visione offuscata con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili).

## Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione all'indirizzo [www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa](http://www.agenziafarmaco.gov.it/content/come-segnalare-una-sospetta-reazione-avversa). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

## 5. Come conservare DERMATAR

Conservi questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla confezione.

La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Non getti alcun medicinale nell'acqua di scarico e nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i medicinali che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

## 6. Contenuto della confezione e altre informazioni

### Cosa contiene DERMATAR

- I principi attivi sono: acido salicilico, solfoititolato di ammonio e betametasona 17-valerato 21-acetato.

1 g di unguento contiene 15 mg di acido salicilico, 15 mg di solfoititolato di ammonio e 0,5 mg di betametasona 17-valerato 21-acetato.

- Gli altri componenti sono: Olio di vaselina, Alcoli di lanolina, Isopropil lanolato, Polietilenglicol monostearato, Butilidrossianisolo, Vaselina.

### Descrizione dell'aspetto di DERMATAR e contenuto della confezione

Confezione contenente un tubo da g 30 di unguento.

### Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e produttore

IDI FARMACEUTICI S.r.l. - Via dei Castelli Romani 83/85- 00071 - Pomezia (RM)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il 23-01-2018